

Protocolo de toma de muestra

SARS-CoV-2

Protocolo de toma de muestra SARS-CoV-2

- **Box toma de muestra:**

1. Lavado clínico de manos. (estricto)
2. Colocación de Overol blanco (cierre anterior, con gorro)
3. Colocación de cubre calzado desechable (Pegar con tela la unión del cubre calzado con el overol)
4. Colocación de guantes de procedimiento, (Pegar con tela la unión de los guantes con el overol)
5. Colocación de pechera celeste (Apertura posterior, impermeable, manga larga, desechable).
6. Higienización de manos (solución hidroalcohólica o jabón)
7. Colocación de mascarilla N ° 95 (Moldear el protector nasal, realizar inspiraciones para cerciorarse de que no existan fugas)
8. Colocación de cubre pelo desechable
9. Colocación de antiparras (Los anteojos no son EPP)
10. Colocación de visor integral (escudo facial)
11. Colocación de guantes estériles
12. Se solicita la supervisión, para la correcta postura de los EPP (Realizar checklist)

- **Toma de muestra en ambulancia:**

- ✓ Se solicita al paciente subir a la ambulancia con mascarilla simple y se explica brevemente el procedimiento.
- ✓ Solicitar al paciente que se limpie la nariz
- ✓ Posicionar la cabeza del paciente en un ángulo de 70 grados.
- ✓ Introducir hisopo en la fosa nasal.
- ✓ Deslizar el hisopo por la mucosa del piso de la fosa nasal hasta tocar la pared posterior de la faringe (nasofaringe)

- ✓ No introducir el hisopo hacia arriba siguiendo la forma de la nariz, sino hacia atrás siguiendo el piso de la nariz.
- ✓ Frotar el hisopo en la nasofaringe, girando para obtener una buena calidad de muestra.
- ✓ Si el hisopo no se introdujo de manera óptima repetir el procedimiento con el mismo hisopo en la otra fosa nasal.
- ✓ Retirar el hisopo, y ponerlo en tubo con medio de transporte, cuidando que quede sumergido en el líquido.
- ✓ Al cortar o quebrar el hisopo, debe cerciorarse que la cabeza del hisopo no toque el fondo del tubo, para así permitir el correcto cierre.
- ✓ Rotular la muestra con los datos del paciente (Nombre completo, RUT y fecha).
- ✓ Cuando estén rotulados, el tubo y bolsa de cierre hermético, introducir en bolsa de transporte a temperatura ambiente.
- ✓ Guardar la muestra en la caja de transporte.

- **Domicilio o lugar de toma de muestra:** (Dependencia moderada /severa)

- ✓ Al llegar se debe identificar un lugar cerca de la ventana, para asegurar ventilación correcta en el hogar, donde sea factible realizar la prueba (mesa, silla o cama), se debe limpiar la zona y desinfectar con alcohol, preparar todos los elementos, para finalmente realizar el test.
- ✓ Continuar con todos los pasos ya descritos para realizar test.
- ✓ Al salir del domicilio, previo a subir a la ambulancia, con la ayuda del conductor, se debe desinfectar ambas cajas, antes de subirlas al móvil. El conductor, quien tendrá puesto un par de guantes, sostendrá la bolsa de REAS, donde se debe colocar todos los EPP desechables y en otra bolsa de basura colocar los EPP reutilizables (Antiparras y escudo facial).

- **Modo de retiro de EPP:**

- ✓ Higienización de manos (solución hidroalcohólica o jabón), retirar la pechera celeste (tracción desde la región anterior esternal y pélvica), enrollar la pechera con la ayuda de sus manos y colocarla dentro de los guantes estériles.
- ✓ Higienización de manos y retirar visor integral, antiparras, cubrepelo, overol, cubre calzado y guantes de procedimiento.
- ✓ Higienización de manos y retirar N 95°
- ✓ Higienización de manos.
- ✓ Entre cada toma de muestras se debe cambiar sólo la pechera celeste y los guantes estériles.
- ✓ El retiro total de los EPP, es al finalizar cada operativo de toma de muestra.

- **Transporte de muestra al Laboratorio:**

- ✓ La muestra debe ir en sus 3 empaques de seguridad: 1.-Tubo con medio de transporte 2.- bolsa cierre hermético 3.- bolsa de transporte temperatura ambiente,
Cada muestra debe ir con su respectivo formulario.
- ✓ Los formularios deben ir pegados con cinta adhesiva, en la tapa de la caja de transporte.
- ✓ El profesional a cargo del transporte de las muestras, debe llevar el libro de registro, donde firmaran la recepción de las muestras y registraran la hora de entrega.
- ✓ Una vez utilizada la caja de transporte se debe lavar con jabón y desinfectar con alcohol al 70°.
- ✓ La encargada de llevar la muestra al hospital es la TENS del establecimiento, se realiza coordinación con hospital para recepción de muestras.
- ✓ Horario de recepción de la muestra hospital: Lunes a Sábado: 11:00 y 16:00 hrs Domingo: 11:30 hrs (Entregar máximo 15 minutos antes de la salida).